OUTIL PRATIQUE SUR LA CONTRACEPTION

SÉLECTION DE PILULES À PROGESTATIF SEUL DISPONIBLES AU CANADA

DONNÉES PROVENANT DE MONOGRAPHIES DE PRODUIT DISTINCTES; LA PORTÉE CLINIQUE N'A PAS ÉTÉ ÉTABLIE.

	Slynd®	**Movisse^{MC}**
Indication	SLYND® est indiqué pour la contraception chez les adolescentes et les femmes adultes. Les comprimés SLYND® ne contiennent qu'un progestatif et ne renferment aucun œstrogène. Les pilules progestatives sont parfois appelées « COP » (pour « contraceptifs oraux progestatifs ») ou « micropilules ».	Les comprimés MOVISSE^{MC} sont indiqués pour la prévention de la grossesse. Les comprimés MOVISSE^{MC} contiennent une dose faible de noréthindrone, non additionnée d'un œstrogène. Ces pilules ne renfermant qu'un progestatif sont souvent appelées « pilules à progestatif seul » ou « minipilules ».
Ingrédient actif	Drospirénone 4 mg	Noréthindrone 0,35 mg
Mode d'action	Principalement en inhibant l'ovulation	Principalement au niveau local pelvien (changements dans la glaire cervicale et dans l'endomètre) À un degré moindre au niveau généralisé (qui comprend principalement l'inhibition de la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires qui, à son tour, empêche la maturation folliculaire et l'ovulation)
Dose omise	**Si une pilule active est oubliée ou en retard (<48 heures depuis la prise de la dernière pilule):** Prendre la pilule oubliée dès que possible. Continuer à prendre une pilule par jour jusqu'à ce que la plaquette soit terminée. Aucune méthode de contraception d'appoint n'est nécessaire. **Si deux pilules actives consécutives sont oubliées (≥48 heures depuis la prise de la dernière pilule):** Prendre la dernière pilule oubliée dès que possible. Continuer à prendre une pilule par jour jusqu'à ce que la plaquette soit terminée. Un autre contraceptif de type non hormonal (comme un condom ou du spermicide) devrait être utilisé en appoint en cas de rapport sexuel dans les 7 jours suivant l'oubli d'un comprimé.	**Si une pilule est oubliée ou en retard > 3 heures:** Prendre la pilule oubliée dès que possible. Continuer à prendre une pilule par jour à la même heure. Une méthode contraceptive d'appoint (comme un condom ou du spermicide) devrait être utilisé en cas de rapport sexuel dans les 48 heures suivant l'oubli d'une pilule.
Posologie	24 comprimés actifs et 4 comprimés inertes	28 comprimés actifs

SLYND® est indiqué pour la contraception chez les adolescentes et les femmes adultes.
Les comprimés SLYND® ne contiennent qu'un progestatif et ne renferment aucun œstrogène. Les pilules progestatives sont parfois appelées « COP » (pour « contraceptifs oraux progestatifs ») ou « micropilules ».

Consultez la monographie de produit au: https://files.duchesnay.com/duchesnay/slynd/slynd-monographie.pdf afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur l'innocuité qui comprend :

- Les contre-indications chez les femmes qui présentent une insuffisance rénale, une insuffisance surrénalienne, des antécédents de cancer du col de l'utérus ou de cancer progestatif-dépendant, des tumeurs hépatiques, bénignes ou malignes, ou une insuffisance hépatique, des saignements utérins anormaux non diagnostiqués ou une hypersensibilité à ce médicament ou à l'un des ingrédients de la formulation de ce dernier.
- Les mises en garde et précautions pertinentes concernant le cancer du sein, l'auto-examen des seins, le cancer du col de l'utérus, les événements thromboemboliques artériels ou veineux, les patientes faisant face à une immobilisation prolongée due à une chirurgie ou à une maladie, la diminution des taux sériques d'estradiol, la perte de la densité minérale osseuse, le risque d'hyperglycémie chez les personnes atteintes de diabète, les patientes diabétiques qui présentent une atteinte vasculaire, les saignements menstruels et les microrragies inhabituels, les saignements anormaux consécutifs à une utilisation prolongée, l'hyperkaliémie, la surveillance des concentrations sériques du potassium chez les femmes qui présentent un risque accru d'hyperkaliémie, la jaunisse ou les troubles aigus ou chroniques de la fonction hépatique, la surveillance et les tests de laboratoire, la dépression, la grossesse ectopique, la grossesse, l'allaitement, l'examen physique et le suivi.
- Les conditions d'usage clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en communiquant avec nous : 1-888-666-0611 ou infomedicale@duchesnay.com

Références :

1. Monographie de SLYND® . 12 avril 2023. Disponible au https://files.duchesnay.com/duchesnay/slynd/slynd-monographie.pdf
2. Monographie de MOVISSE^MC. 9 août, 2022. Disponible au https://www.viatris.ca/-/media/project/common/global/global-product-catalog/product-catalog-canada/files/product-resource-files-fr-ca/movisse-pm-fr.pdf
3. CDC - Recommended Actions After Late or Missed Progestin-only Pills (en anglais suelement). Disponible au https://www.cdc.gov/contraception/media/pdfs/2024/07/recommended-action-late-missed-progestin-508.pdf (anglais seulement)

DUCHESNAY

Compagnie pharmaceutique canadienne basée au Québec

RÉVISÉ PAR CCPP